


Ansteckende Kinderkrankheiten - Factsheet

Generell gilt:

Ein Kind, das sich krank fühlt, bleibt zuhause.

Ab einer Körpertemperatur von 38.5° hat das Kind Fieber und bleibt zuhause.

Bevor ein erkranktes Kind zurück in die Schule darf, muss es mindestens 24 h fieberfrei sein.



Zu den meistverbreiteten Kinderkrankheiten gehören unter anderem:

Kinderkrankheiten	Ansteckungsdauer	Zurück in den KIGA / die Schule...
Bindehautentzündung (Kerato-Konjunktivitis epidemica)	14 Tage ab Symptombeginn	Bei einer vom Arzt bestätigten Kerato-Konjunktivitis epidemica: 14 Tage nach Symptombeginn Bei einer anderen Form der Bindehautentzündung: je nach Gesundheitszustand des Kindes
Gastroenteritis (Breachdurchfall)	Bis ca. 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall	Wenn sich das Kind gesund fühlt: 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall
Hand-Fuss-Mund-Krankheit	Ansteckung kann vermieden werden: - Kein enger Körperkontakt - Gute Händehygiene	Schulbesuch möglich, wenn sich das Kind gesund fühlt
Keuchhusten	Mit Antibiotika: bis 5 Tage nach Beginn der Behandlung Ohne Antibiotika: bis 3 Wochen nach Beginn der Hustenattacken Die meisten Kinder sind gegen Keuchhusten geimpft	Nach Einnahme eines Antibiotikums und wenn sich das Kind gesund fühlt: Ab dem 6. Tag nach Einnahme des Antibiotikums Ohne Antibiotikum: 21 Tage nach Symptombeginn
Lausbefall	Übertragung nur durch engsten Körperkontakt	Die Schule darf besucht werden. Kein enger Körperkontakt zu Mitmenschen, bevor die Läuse/Nissen nicht manuell entfernt wurden. Detailliertes Vorgehen gem. Läuse-Elterninfo Umgehende Information an die Lehrperson

Masern (Morbilli)	Hohe Ansteckungsgefahr bei ungeimpften Personen Ansteckend bis 4 Tage nach Ausbruch des Ausschlages Die meisten Kinder sind gegen Masern geimpft	Wenn sich das Kind gesund fühlt: Nach 5 Tagen nach Auftreten des Ausschlages
Mumps	2 – 4 Tage nach Symptombeginn: grosse Ansteckungsgefahr Bis 9 Tage nach Symptombeginn: Geringe Ansteckungsgefahr	Wenn sich das Kind gesund fühlt: 5 Tage nach Beginn der Mumps-Erkrankung
Ringelröteln (Erythema infectiosum)	Ansteckungsgefahr sehr gering nach Ausbruch des Ausschlages	Wenn Kind sich gesund fühlt, darf es umgehend wieder in die Schule. Wichtig: Info an die LP, schwangere Personen müssen geschützt werden
Röteln (Rubella-Virus)	Bis 7 Tage nach Ausbruch des Ausschlages Die meisten Kinder sind gegen Röteln geimpft	Wenn sich Kind gesund fühlt: Nach 8 Tagen nach Auftreten des Ausschlages Wichtig: Info an die LP, schwangere Personen müssen geschützt werden
Scharlach	Mit Antibiotika: nach 24 Stunden nicht mehr ansteckend. Ohne Antibiotika: gut 3 Wochen oder länger	Nach Einnahme eines Antibiotikums und wenn sich das Kind gesund fühlt: Ab dem 2. Tag nach Einnahme des Antibiotikums
Windpocken	Ansteckend bis letztes Bläschen verkrustet ist	Wenn das letzte Bläschen verkrustet ist

Ab 2 Wochen Absenz kann die Schule ein Arzteugnis verlangen.

Weitere Infos unter:

- <https://www.ag.ch/de/verwaltung/dgs/gesundheit/kantonsaerztlicher-dienst/merkblaetter-infektionskrankheiten-und-impfungen>
- <https://www.impfen.de/wissenswelt/nach-krankheit-wieder-in-die-kita-oder-schule/>
- <https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/dgs/dokumente/gesundheit/gesundheitsfoerderung-praevention/infektionsschutz>
- <https://deximed.de/home/klinische-themen/paediatric/patienteninformationen/infektionen>
- <https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe>